VET PETCARE

HENRY SCHEIN®

900-9500

UK 0.40% Stannous Fluoride Gel

Use: Topical fluoride is antibacterial, inhibits plaque formation, reduces dental hypersensitivity and is good to use in cases where there is advanced periodontal disease or enamel hypoplasia.

Directions: Twist off cap to remove foil seal. Apply a pea sized amount of the gel wlth a soft tooth brush (or finger brush) to the outer surfaces of the teeth on each side of the mouth twice a week, or as directed by your veterinarian. For best results, do not give food or water for 30 minutes after fluoride gel application. If more gel than is typically used for product administration is swallowed, contact a veterinarian immediately for instructions.

Warnings: This product is only for use in animals under the supervision of a veterinarian. Keep out of reach of children. Use only as recommended by your veterinarian.

Inactive Ingredients: Carbopol, flavor, glycerine, hydroxyethyl cellulose, keltrol, malic acid, sodium fluoride, water.

ES Gel de fluoruro de estaño 0,4%

Empleo: el fluoruro tópico es antibacteriano, inhibe la formación de placa, reduce la hipersensibilidad dentinaria y es apropiado de usar en casos de periodontitis avanzada o hipoplasia del esmalte.

Indicaciones: desenroscar el tapón para retirar el precinto de seguridad. Aplicar dos veces a la semana con ayuda de un cepillo de dientes blando (o cepillo de “dedo”) una cantidad de gel del tamaño de un guisante sobre la superficie exterior de los dientes por ambos lados de la boca o bien siguiendo las indicaciones de su veterinario. Para obtener unos mejores resultados se recomienda no dar comida o agua durante los 30 minutos posteriores a la aplicación del gel de fluoruro. En caso de ingerirse una cantidad de gel superior a la habitualmente empleada para la administración del producto, póngase en contacto de inmediato con un veterinario.

Advertencias: este producto está pensado únicamente para su empleo en animales bajo la supervisión de un veterinario. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar siguiendo únicamente las indicaciones de su veterinario.

Ingredientes inactivos: Carbopol, aroma, glicerina, hidroxietilcelulosa, keltrol, ácido málico, iones fluoruro, agua.

FR Gel au fluorure d'étain 0,40 %

Utilisation : le fluorure topique est antibactérien. Il empêche la formation de la plaque dentaire, il réduit l’hypersensibilité dentaire et est indiqué en cas de maladie parodontale ou d’hypoplasie de l’émail.

Mode d’emploi : dévisser le capuchon pour ôter l’opercule en aluminium. Appliquer une noisette de gel à l’aide d’une brosse à dent souple (ou un doigtier) sur les surfaces extérieures des dents de chaque côté de la bouche deux fois par semaine ou comme indiqué par votre vétérinaire. Pour un résultat optimal, ne pas donner à boire ou à manger pendant 30 minutes après l’application du gel au fluorure. Si une quantité de gel supérieure à celle habituellement recommandée est ingérée, contacter immédiatement un vétérinaire.

Précautions d’emploi : A n’utiliser que sur l’animal et sous contrôle d’un vétérinaire. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser uniquement conformément aux recommandations de votre vétérinaire.

Ingrédients non actifs: carbopol, arôme, glycérine, hydroxyéthylcellulose, keltrol, acide malique, ion fluorure, eau.

DE Zinnfluoridgel 0,4 %

Anwendungsbereich: Topisches Fluorid wirkt antibakteriell, hemmt Plaquebildung, schützt vor überempfindlichen Zähnen und wird bei akuter Zahnfleischentzündung sowie starkem hypoplastischem Zahnschmelz angewendet.

Art der Anwendung: Öffnen Sie den Verschluss, um die Schutzfolie zu entfernen. Falls von Ihrem Tierarzt nicht anders verordnet, tragen Sie zweimal pro Woche eine erbsengroße Menge des Gels mit einer weichen Zahnbürste (oder Fingerbürste) auf die Außenseiten der Zähne auf beiden Seiten des Mauls auf. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie darauf achten, dass Ihr Tier 30 Minuten nach der Anwendung des Fluoridgels nichts frisst oder trinkt. Sollte Ihr Tier eine größere Menge des Gels geschluckt haben, als für die Anwendung vorgesehen, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Tierarzt.

Achtung: Das Produkt darf nur bei Tieren angewendet werden, die unter Beobachtung eines Tierarztes stehen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Produkt nur nach Anweisung Ihres Tierarztes anwenden.

Weitere Inhaltsstoffe: Carbopol, Aromen, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Keltrol, Apfelsäure, Fluorid Ion, Wasser.

IT Gel al fluoruro stannoso 0,4%

Uso: il fluoro topico è antibatterico, inibisce la formazione della placca, riduce l´ipersensibilità dentinale ed è un rimedio efficace nei casi di patologia periodontale avanzata o ipoplasia dello smalto.

Istruzioni: svitare il tappo e rimuovere la pellicola protettiva. Con uno spazzolino morbido (o con uno spazzolino da dito) applicare una piccola quantità del gel sulla superficie esterna dei denti da entrambi i lati della bocca due volte alla settimana o come prescritto dal vostro veterinario. Per ottenere i migliori risultati non somministrare né cibo né acqua nei 30 minuti successivi all´applicazione del gel al fluoruro. Qualora fosse ingerita una quantità di gel superiore a quella generalmente somministrata, rivolgersi immediatamente a un veterinario.

Avvertenze: utilizzare questo prodotto solo negli animali e sotto la supervisione di un veterinario. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Da usare solo come consigliato dal vostro veterinario.

Ingredienti inattivi: Carbopol, aroma, glicerina, idrossietilcellulosa, gomma di xantano, acido malico, fluoruro di sodio , acqua.

PT 0,4% Gel de fluoreto estanhoso:

Utilização: o flúor tópico é antibacteriano e inibe a formação de placa, diminui a hipersensibilidade dentária e aconselha-se a sua aplicação em situações de doença periodontal ou hipoplasia do esmalte em estado avançado.

Instruções: retire a tampa de rosca e remova o selo de alumínio. Aplique com uma escova suave (ou com uma escova de dedo) uma gota de gel do tamanho de uma ervilha nas superfícies externas dos dentes em ambos os lados da boca, duas vezes por semana ou conforme recomendado pelo seu veterinário. Para obter melhores resultados, não deve dar comida ou água nos 30 minutos seguintes à aplicação do gel de flúor. Se uma quantidade de gel superior à quantidade habitualmente utilizada for engolida, contacte o seu veterinário imediatamente.

Aviso: Este produto destina-se apenas a animais que se encontrem sob supervisão de um veterinário. Manter fora do alcance das crianças. Usar apenas de acordo com as recomendações do seu veterinário.

Ingredientes inativos: carbopol, aroma, glicerina, hidroxietilcelulose, keltrol, ácido málico, fluoreto de sódio, água.

Distributed by (in US only)

(manufacturer) **Henry Schein Inc. – 135 Duryea Road, Melville, NY 11747 USA**

Henry Schein U.K. Holdings Ltd. – Medcare House, Centurion Close, Gillingham Business Park, Gillingham, ME8 0SB U.K.

www.henryscheinbrand.com

Rev.2013/07